Die Grundwasserneubildung im Landkreis Vechta

Dr. Mithra-Christin Hajati

Wetter ≠ Klima

<https://www.australianenvironmentaleducation.com.au>

Wetter: Verändert sich schnell und ist geprägt von Zufallsschwankungen

Klima: Verändert sich langsam

Viel-jährliche Trendbetrachtungen:

- 1961/1990 (WMO-Standard-Referenzperiode)
- 1971/2000 (Referenzperiode der Klimamodelle)
- 1981/2010
- 1991/2020 (aktuelle Vergleichsperiode)
- 2021/2050 (*Nahe Zukunft*)
- 2071/2100 (*Ferne Zukunft*)

mGROWA - Die Modellarchitektur

= KWB
(Klimatische Wasserbilanz)

- Oberflächenabfluss
- Vorfluter
- Zwischenabfluss

→ Die Grundwasserneubildung passiert maßgeblich im Winterhalbjahr, wenn die Evapotranspiration gering und der Niederschlag hoch ist.

Geobericht 36 (2019)

Klimaentwicklungen in Vechta - Niederschlag

Kalenderjahr: Abweichung des Niederschlags zu 1961-1990 (733 mm/a) in Vechta

1971-2000: -0 mm/a
1981-2010: +31 mm/a
1991-2020: +8 mm/a

Datengrundlage: HYRAS-DE-PRE Version v5.0

Klimaentwicklungen in Vechta - Niederschlag

- Seit 1931 gibt es eine leichte Zunahme der Jahresniederschläge
- Periode 1991-2020 zeigt im Verhältnis zu 1961-1990 niederschlagsreiche Winter/Sommer/Herbste und besonders niederschlagsarme Frühlinge
- Die letzten 10 Jahre waren im Verhältnis zu 1991-2020 besonders trocken in allen Jahreszeiten, bis auf den Winter

Klimaentwicklungen in Vechta – Klimatische Wasserbilanz

Hydrologisches Jahr: Abweichung der Klimatischen Wasserbilanz zu 1961-1990 (173 mm/a) in Vechta

1971-2000: -16 mm/a
 1981-2010: +2 mm/a
 1991-2020: -32 mm/a

Datengrundlage: HYRAS-DE-PRE Version v5.0 und DWD (unveröffentlicht)

Klimaentwicklungen in Vechta – Klimatische Wasserbilanz

- Seit 1961 gibt es eine Abnahme der jährlichen Klimatischen Wasserbilanz
- Periode 1991-2020 zeigt im Verhältnis zu 1961-1990 eine Zunahme der Klimatischen Wasserbilanz im Winter/Herbst und eine Abnahme im Frühling/Sommer
- Die letzten 10 Jahre waren im Verhältnis zu 1991-2020 besonders trocken in allen Jahreszeiten, bis auf den Winter

mGROWA22 - Die Grundwasserneubildung in Vechta

Grundwasserneubildung in Niedersachsen und dem Landkreis Vechta

166 mm/a

163 mm/a

174 mm/a

156 mm/a

Datengrundlage: mGROWA22

mGROWA22 - Die Grundwasserneubildung in Vechta

Abweichung der Grundwasserneubildung zu 1961-1990 (166 mm/a) im Landkreis Vechta

1971-2000: -3 mm/a
 1981-2010: +8 mm/a
 1991-2020: -10 mm/a

Datengrundlage: mGROWA22

- Die Grundwasserneubildung schwankt innerhalb der 30-jährigen Mittel um ± 10 mm
- Bis auf 2016 anhaltende „Grundwasserdürre“ von 2011 bis 2020
- Die stabilen Winterniederschläge, bzw. KWB, dämpfen die extremen trockenen Sommer ab

Was bringt die Zukunft?

Projizierte Klimaentwicklungen in Vechta: Niederschlag

Kalenderjahr: Projizierte Änderung (Mittelwert des Ensembles)

Datenherkunft: AR5-NI, Version v2.1

Mittlerer Monatsniederschlag im Landkreis Vechta

- Der Niederschlag nimmt im jährlichen Mittel im RCP8.5 Szenario stark zu
- Der Niederschlag nimmt im Winter stark zu und im Sommer stark ab (RCP8.5)
- Zukünftig können die Winter niederschlagsreicher sein als die Sommer (RCP8.5)

Projizierte Klimaentwicklungen in Vechta: Klimatische Wasserbilanz

Kalenderjahr: Projizierte Änderung (Mittelwert des Ensembles)

Legende

Datenherkunft: AR5-NI, Version v2.1

- Die Klimatische Wasserbilanz nimmt im Mittel besonders im RCP8.5 Szenario ab
- Die Klimatische Wasserbilanz nimmt im Winter zu und im Sommer, aufgrund der zurückgehenden Niederschläge und der hohen Temperaturen, stark ab (RCP8.5)

mGROWA22 - Die projizierte Grundwasserneubildung in Vechta

Änderung der Grundwasserneubildung 2071-2100 zu 1971-2000 mit dem RCP8.5 Szenario

- Aufgrund der saisonalen Veränderung der KWB nimmt die Grundwasserneubildung im Sommerhalbjahr ab und im Winterhalbjahr zu – Diese Änderungen sind heute teilweise schon erkennbar!
- Der zusätzliche Niederschlag im Winterhalbjahr kann den fehlenden Niederschlag im Sommerhalbjahr im Besonderen aufgrund der künstlichen Entwässerung nicht ausgleichen.
- Für Niedersachsen ist daher eine der wichtigsten Klimaanpassungsmaßnahmen Wasser in der Fläche zu halten.
- Die Auswirkungen des zusätzlichen Nutzungsdrucks im Sommerhalbjahr ist nicht Bestandteil der Grundwasserneubildungsbetrachtung, hat jedoch großen Einfluss auf die Ressource

Alle Werte sind Angaben für den LK Vechta

Danke für Ihre Aufmerksamkeit !

Dr. Mithra-Christin Hajati

Tel.: 0511-643-2507
0511-120-3512

E-Mail: mithra-christin.hajati@lbeg.niedersachsen.de
mithra-christin.hajati@mu.niedersachsen.de